

ព្រៃកណ្តាល

A1, A4i & A4iii

- ទេត្ត** : បាត់ដំបង
- ស្រុក** : ឯកភ្នំ សង្កែ និង មោងឫស្សី
- ផ្ទៃដី (ហិកតា)** : ៣៩.៨៧៣
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ៤ ដល់ ៧
- កូអរដោនេចម្រុកឈ្នួល** : ១៣⁰៧'៥ ១០៣⁰៣៩'ក



ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ព្រៃកណ្តាល គឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ទាំងឡាយដែលមានព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់វង្សបានល្អបំផុតនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប ។ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះអាចសម្រប និង ធន់បានជាមួយនឹងភាពខុសគ្នានៃកំរិតកំពស់ទឹកតាមរដូវកាល ដែលមានជំរៅរហូតដល់ទៅ១០ម៉ែត្រ និង មានព្រៃលិចទឹកលើដីដែលមានកំពស់ពី ៧ ដល់ ១៥ម៉ែត្រ គ្របដណ្តប់លើសលប់ដោយប្រភេទរាំងទឹក (*Barringtonia acutangula*) និង ផ្តល់ ឬ អាចម័កណុរ (*Diospyros cambodiana*) ហើយភាពផ្សេងៗនៃប្រភេទដើមឈើវិល្លី និង ព្រៃតុម្តោតទាបៗ ។ នៅក្នុងរដូវប្រាំង (ពីខែមករា-ឧសភា) ដើមឈើធំៗទាំងនេះបានទ្រទ្រង់នូវបន្ទាយពងកូនធំបំផុតរបស់ពពួករទាស ទុង និង ត្រយ៉ង់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអភ្នេយ៍ ។ តំបន់តូស្តាបសំខាន់ៗ (IBA) នេះស្ថិតចំកណ្តាលតំបន់ស្នូលព្រៃកណ្តាលនៃតំបន់បរិយេជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប ហើយរួមបញ្ចូលបន្ទាយពងកូនសត្វស្លាបទឹកទាំងអស់ និង តំបន់ព្រៃលិចទឹកវាលភក់សំខាន់ៗផ្សេងទៀត ។ តំបន់នេះទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងឡឆ្នាំនៃសោទលេខ២នៃខេត្តបាត់ដំបងដែលគេធ្វើការនេសាទត្រីមានទ្រង់ទ្រាយជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែកក្កដា ហើយការចូលទៅកាន់តំបន់នេះមានការពិបាកចំពោះអ្នកណាដែលមិនមែនជាបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់ឡឆ្នាំនៃសោទ ។ បន្ទាយពងកូនសត្វស្លាបទឹកព្រៃកណ្តាល ប្រភេទសត្វខ្លះមានចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកដូចជា ទុងប្រផេះ ត្រដក់ធំ ហើយប្រហែលអាចជាកន្លែងតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោក ដែលមានរទាសពងកូននៅក្នុងតំបន់ទឹកសាប ។ ជានេះទៀត តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់បន្ទាយពងកូននៅរដូវវស្សារបស់ស្មោញ អកត្រី ក្បាលប្រផេះ និង ប្រភេទពពូលទឹក ដែលគេបានកត់ត្រាកូនរបស់វាពីតំបន់នេះ ។

ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

| ឈ្មោះខ្មែរ | ឈ្មោះអង់គ្លេស | ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ | លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ IBA |
|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| កុកក្រោងធំ | Great Egret | <i>Casmerodius albus</i> | A4i |
| ក្អែកទឹកតូច | Indian Cormorant | <i>Phalacrocorax fuscicollis</i> | A4i |
| ក្អែកទឹកមធ្យម | Indian Cormorant | <i>Phalacrocorax fuscicollis</i> | A4i |
| ចង្កៀលខ្យង | Asian Openbill | <i>Anastomus oscitans</i> | A4i |
| ត្រដក់តូច | Lesser Adjutant | <i>Leptoptilos javanicus</i> | A1 A4i |
| ត្រដក់ធំ | Greater Adjutant | <i>Leptoptilos dubius</i> | A1 A4i |
| ត្រយ៉ង់ខ្លួន ស | Black-headed Ibis | <i>Threskiornis melanocephalus</i> | A1 A4i |

| | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|----|-----|
| ទុងប្រផេះ | Spot-billed Pelican | <i>Pelecanus philippensis</i> | A1 | A4i |
| ពពួលទឹក | Masked Finfoot | <i>Heliopais personata</i> | A1 | |
| រនាសពណ៌ | Painted Stork | <i>Mycteria leucocephala</i> | A1 | A4i |
| រនាស ស | Milky Stork | <i>Mycteria cinerea</i> | A1 | A4i |
| ស្មៅញូ | Darter | <i>Anhinga melanogaster</i> | A1 | A4i |
| អកត្រីក្បាលប្រផេះ | Grey-headed Fish Eagle | <i>Ichthyophaga ichthyaetus</i> | A1 | |

ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់

មានសត្វស្លាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃស្រោង (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

ប្រភេទពានរងគ្រោះនៃការគំរាមកំហែងពិភពលោក

រញីប្រផេះ ស្វាក្តាម និង ស្វាព្រាម ។

ប្រភេទអណ្តើក កន្ទាយ និង ក្រពើទឹកនៃការគំរាមកំហែងពិភពលោក

ក្រពើទន្លេ (ក្រពើត្រី) អណ្តើកបិទមុខស្លឹកខ្មៅ អណ្តើកក្របីក្បាលលឿង អណ្តើកសកល និង កន្ទាយអាស៊ី ។

ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះ

ការប្រមូលយកពងកូនពីសំបុកនៅតែជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតចំពោះការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វស្លាបទឹក នៅក្នុងបន្ទាយពងកូនបឹងទន្លេសាប ។ ក្រុមអ្នកប្រមូលយកពងកូនសត្វស្លាបទឹកធំៗមានបំណងទៅកាន់បន្ទាយពងកូនរបស់ស្មៅញូ ទុងរនាស និង ត្រយឹង ដើម្បីប្រមូលពងកូន ហើយបានធ្វើដំណើរជាច្រើនដងចូលទៅក្នុងព្រៃលិចទឹកក្នុងអំឡុងពេលរដូវពងកូន ។ ការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់មន្ត្រីជំនាញ និង ក្រុមអភិរក្សអន្តរជាតិ ហើយនិងការបង្កើតឡើងទីស្នាក់ការបរិស្ថានព្រៃកណ្តាប់បានកែលំអរស្ថានភាពនៅក្នុងបន្ទាយពងកូនយ៉ាងសំខាន់នោះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧ ។ ការប្រមូលយកពងកូនធ្វើឡើងដោយប្រជាជនរស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាប (អ្នកនេសាទ) បានថយចុះគួរយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្តែគេរាយការណ៍ថា សកម្មភាពនេះនៅតែមានធ្វើឡើងដោយប្រជាកសិករដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់បឹងទន្លេសាបពីបណ្តាតំបន់ខាងលើខ្ពង់ខ្ពស់ខេត្តបាត់ដំបង ។

ក្រៅពីការនេសាទ ប្រាក់ចំណូលសំខាន់បានមកពីការលក់អុសនៃព្រៃលិចទឹក ។ ការកាប់អុសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការដាំស្លក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវបានគេជឿថា មាននិរន្តរភាពនៅពេលដែលរុក្ខជាតិព្រៃលិចទឹកដុះលូតលាស់ឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឱ្យកត់សំគាល់បន្ទាប់ពីមានការកាប់ហើយ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកាប់ដើមឈើធំៗអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដើមឈើដែលសត្វស្លាបទឹកធំៗធ្វើសំបុកពងកូន ។

អន្តរាគមន៍

ការផ្តួចផ្តើមការអភិរក្សនាពេលថ្មីៗធ្វើឡើងជាមួយក្រុមអភិរក្សតាមមូលដ្ឋានការពារបន្ទាយសត្វស្លាប គួរតែធ្វើការផ្គត់ផ្គង់បន្តទៀត និង ពង្រីកតាមរយៈការជ្រើសរើសអ្នកភូមិបន្ថែម និង ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង ធនធានទាំងឡាយដល់ពួកគាត់ ។

តំបន់ស្នូលព្រៃកណ្តាប់ គួរតែកាត់ចេញពីប្រព័ន្ធទ្វីតនេសាទ ហើយបង្កើតការអភិរក្សជាដៃគូបម្រុងទុកមធ្យមជាតិស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ជលផល ។

មន្ត្រីជំនាញគួរតែធ្វើការជាមួយក្រុមអភិរក្សមូលដ្ឋាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រមាញ់ និង សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ស្នូលព្រៃកណ្តាប់ដោយអនុវត្តច្បាប់ជលផល និង ច្បាប់ព្រៃឈើ ។

ធ្វើការជាមួយក្រុមអភិរក្សមូលដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើតឡើងនូវច្បាប់ និង រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ផ្នែកទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ជាពិសេស ផ្តោតលើការកាត់បន្ថយនូវការរំខានដល់បន្ទាយពេញកូនរបស់សត្វស្លាប និង ចែកចាយដំណើរការដោយសមធម៌ជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ។

ការផ្តួចផ្តើមគំនិតការអប់រំបរិស្ថាននាពេលថ្មីៗ ធ្វើជាមួយទាំងមនុស្សពេញវ័យ និង ក្មេងតូចៗ ជាពិសេសនៅសាលារៀន គួរតែផ្គត់ផ្គង់បន្តទៀត និង ពង្រីកឱ្យបានទូលំទូលាយនៅតាមសហគមន៍ក្នុងតំបន់ទាំងមូល ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តគួរតែផ្តើមឡើង ដើម្បីកំណត់រកតំបន់រកស៊ីសំខាន់ៗរបស់សត្វស្លាបទឹកក្នុងអំឡុងពេលរដូវពេញកូន និង បង្កើតឡើងកម្មវិធីរយៈពេលយូរសម្រាប់ពិនិត្យឃ្នាំមើលចំនួនសត្វស្លាប ។

ឯកសារយោង

Carr, P. (1998) Notes on the trade of large waterbirds for food in Cambodia. *Bull. Oriental Bird Club* 27: 49-50.

Ear-Dupuy, E., Briggs, E., Hong Chamnan and Keo Omaliss (1998) *Waterbird conservation in Prek Toal area, Battambang province, Cambodia*. Phnom Penh: Wetlands International.

Goes, F. and Davidson, P. eds. (2002) Recent sightings. *Cambodia Bird News* 9: 47-59.

Goes, F., Hong Chamnan, Suon Mean, Luon Keng and Meas Rethy (1998) *Waterbird counting and survey at Prek Toal and Boeng Chhma/Moat Khla, May-June 1998*. Phnom Penh: Tonle Sap Technical Coordination Unit/Ministry of Environment.

Goes F. and Hong Chamnan (2002) *The status and conservation of large waterbirds on the Tonle Sap Great Lake, Cambodia 2000-2001*. Phnom Penh: Wildlife Conservation Society.

McDonald, A., Pech Bunnat, Phauk Virak and Leen Bunton (1997) *Plant communities of the Tonle Sap floodplain*. Phnom Penh: UNESCO.

Mundkur, T., Carr, P., Sun Hean and Chhim Somean (1995) *Surveys for large waterbirds in Cambodia, March-April 1994*. Cambridge, UK: IUCN/SSC.

Parr, J. W. K., Eames, J. C., Sun Hean, Hong Chamnan, Som Han, Vi La Pich and Seng Kim Hout (1996) *Biological and social aspects of waterbird exploitation and natural resource utilization of Prek Toal, Tonle Sap Lake, Cambodia*. Cambridge, UK: IUCN/SSC.