

**ផែនប**

A1, A3 & A4i

- ខេត្ត** : ព្រះវិហារ
- ស្រុក** : វែប និង ជាំក្សាន្ត
- ផ្ទៃដី ( ហិកតា )** : ២៤៣.៦៦១
- រយៈកំពស់ ( ម៉ែត្រ )** : ៣៥ ដល់ ៧៦៧
- កូអរដោនេចំនុចកណ្តាល** : ១៤° ០៤ ' ជ ១០៥° ៣០ ' ក



**ការពិពណ៌នាទីកន្លែង**

តំបន់ IBA នេះ ស្ថិតនៅក្នុងវាលរាបភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រង់តំបន់ព្រៃអភិរក្សធនធានសេនេទិច និង សត្វព្រៃ "ព្រះវិហារ" ក្នុងស្រុកវែប និង ជាំក្សាន្ត ។ រុក្ខជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះមានលក្ខណៈទីជំរកស្មុគស្មាញដោយសារគុណភាពដី ដែលស្ថិតនៅជិតទឹក និង តាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ។ ប្រភេទដីសម្បូរដោយខ្យង និង ខ្សោះជីជាតិទ្រទ្រង់នូវប្រភេទព្រៃបោះដែលគ្របដណ្តប់លើសលប់ដោយលើពីរទៅបីប្រភេទប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រភេទដីល្បាប់មានជីជាតិ ជានិច្ចកាលស្ថិតនៅជិតមាត់ទឹកទ្រទ្រង់ព្រៃលើច្រើនប្រភេទគ្របដណ្តប់លើសលប់ដោយដើមឈើធំៗ ដែលមានតំបន់ព្រៃផ្តល់ម្ហូបបានល្អស្រទាប់ស្មៅខាងក្រោម ។ វាលស្មៅលិចទឹកតាមរដូវកាលផ្តល់លើយើងនៅក្នុងព្រៃបោះនៃតំបន់នេះ គឺជាវាលស្មៅល្អមានតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលសេសសល់ក្នុងតំបន់អាស៊ី ។ នៅប៉ែកខាងជើង តំបន់នេះជាប់ជាមួយនឹងបណ្តាតំបន់ដែលមានប្រភេទទីជំរកធម្មជាតិស្រដៀងគ្នាក្នុងប្រទេសឡាវ ។

តំបន់នេះទ្រទ្រង់ពពួកសត្វស្លាបច្រើនប្រភេទរស់ក្នុងប្រភេទព្រៃបោះនៃតំបន់កណ្តាលក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន ហើយក៏បានទ្រទ្រង់ផងដែរនូវប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែង និង ជិតរងគ្រោះក្នុងពិភពលោក រួមមានក្រោក ទាព្រៃស្លាបស ក្រៀល ត្នាតផេះ ត្នាតត្នោត ត្នាតភ្លើង ត្រដក់ធំ ត្រដក់តូច និង អង្កត់ខ្មៅ ។ ជាការកត់សំគាល់បំផុតនោះគឺ តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ចំនួនរបស់ប្រភេទត្រយ៉ងយក្សចំនួនច្រើនក្បាលបំផុតក្នុងពិភពលោក លើសពីនេះទៀត វាក៏បានទ្រទ្រង់ផងដែរនូវប្រភេទចាបដូនតាវាលស្រៃ ។

**ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ**

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ IBA
ក្រោក	Green Peafowl	<i>Pavo muticus</i>	A1
កេងកងធំ	Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	A1
ក្រៀល	Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	A1
ចាបដូនតាវាលស្រៃ	Manchurian Reed Warbler	<i>Acrocephalus tangorum</i>	A1
ចាបពួកទ្រូងលឿង	Asian Golden Weaver	<i>Ploceus hypoxanthus</i>	A1
ត្នាតត្នោត	Long-billed Vulture	<i>Gyps indicus</i>	A1
ត្នាតផេះ	White-rumped Vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	A1
ត្នាតភ្លើង	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	A1

ត្រដក់តូច	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos javanicus</i>	A1	A4i
ត្រដក់ធំ	Greater Adjutant	<i>Leptoptilos dubius</i>	A1	
ត្រយឹងយក្ស	Giant Ibis	<i>Pseudibis gigantea</i>	A1	A4i
ទាព្រៃស្លាបស	White-winged Duck	<i>Cairina scutulata</i>	A1	
ស្នាំងស្លាបស្រួចចុងខ្នងស	White-rumped Falcon	<i>Polihierax insignis</i>	A1	
អង្កត់ខ្មៅ	Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	A1	A4i
អកត្រីក្បាលប្រផេះ	Grey-headed Fish Eagle	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	A1	
អកខ្មៅដំរើម	Greater Spotted Eagle	<i>Aquila clanga</i>	A1	

**ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់**

មានសត្វស្លាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃតំបន់ភ្នំខ្ពស់ៗ ប្រាំប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃស្រោង និង ១៤ប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃរោះ (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

**ប្រភេទពាសរាជានិច្ចលេខរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក**

រញិប្រផេះ ស្វាត្រាស និង ស្វាក្តាម ។

**ប៊ីរី និង ពពួកក្រចកចំរាមចម្បងរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក**

ដីរី រមាំង ខ្នឹង និង ទន្សោង ។

**ប្រភេទអណ្តើក កន្ទាយ និង ក្រពើចម្បងរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក**

អណ្តើកបិទមុខស្លុកខ្មៅ អណ្តើកសោមញី អណ្តើកក្របីក្បាលលឿង អណ្តើកព្រិច និង កន្ទាយអាស៊ី ។

**ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះ**

ការប្រមាញ់កើតឡើងក្នុងកិរិយាប ជាសំខាន់សម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមក្នុងជីវភាពរស់នៅ ហើយទោះជាគេគិតថាការបរហាញមានការកើនឡើង ក៏បច្ចុប្បន្នការគំរាមកំហែងនេះមិនជះឥទ្ធិពលចំពោះសត្វស្លាបទឹកធំៗឡើយ ។ ប៉ុន្តែអាចកើតឡើងដោយសារការប្រមូលយកពងកូនពីសំបុក ជាពិសេសក្រៀល ។ ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលរស់នៅជិតព្រំដែនឡាវបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលក្នុងត្រពាំង និង តាមអូរនានាដើម្បីចាប់ត្រី ដែលសកម្មភាពនេះអាចធ្វើឱ្យសត្វស្លាបទឹកងាប់ផងដែរ ។ ការនេសាទដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះ តាមរបាយការណ៍មានការកើនឡើងនៅតាមត្រពាំងនានា ។ ការគំរាមកំហែងមួយទៀតលើជីវៈចម្រុះ គឺការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ជាពិសេសនៅតាមផ្លូវទឹក ។ ការគំរាមកំហែងចំបងនាពេលអនាគតលើជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់រួមមានជនអន្តោប្រវេសន៍ (តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវថ្នល់តាមខេត្ត) ការពង្រីកដឹកសិកម្ម និងការកើនឡើងនៃការបរហាញដោយសារមានមនុស្សចំណូលថ្មី ។

**អនុសាសន៍**

វិធានការបង្ក្រាបការបរហាញ និង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃគួរតែអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល ដោយបង្កើតឡើងប្រព័ន្ធល្បាតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សខេត្តព្រះវិហារ ។

ការដៅលើផែនទីនូវរាល់តំបន់ដីសើម និង តំបន់ពងកូនសំខាន់ៗរបស់សត្វព្រៃ និង កន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់ ព្រៃការពារខេត្តព្រះវិហារគួរតែអនុវត្ត ។ ការងារនេះនឹងតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម ហើយយកទិន្នន័យទាំងនេះ មកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើផែនការអភិរក្ស ។

មានការទទួលស្គាល់លើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ខេត្តពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ។

ការអភិរក្សសត្វស្លាបទឹកធំៗគួរតែបញ្ចូលក្នុងសកម្មភាពការងារបញ្ចុះបញ្ជូនដោយធ្វើការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីអភិ រក្សសត្វទាំង ។

បង្កើតឡើងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍លើការប្រើប្រាស់តំបន់ដីសើមសំខាន់ៗ ឆ្នែប្រមាញ់ ការប្រមូលយកពងកូន និង ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល ។ កម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ភូមិសំខាន់ៗគួរតែធ្វើឡើង ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យ និង ជួយទ្រទ្រង់ ដល់ការអភិរក្សដោយផ្អែកលើសហគមន៍ ។

ការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ ការតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ និង ទន្រ្ទានយកដីនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សខេត្ត ព្រះវិហារគួរតែទប់ស្កាត់ ។

**ឯកសារយោង**

Barzen, J. (2001) Waterbirds and wetlands of northern Cambodia. *Bugle* 27(4): 1-2.

Barzen, J. (2002) Waterbirds and wetlands of northern Cambodia. *Cambodia Bird News* 9:36-38.

Davidson, P. (2001) A further twelve new species for Cambodia. *Cambodia Bird News* 7: 26-35

Davidson, P., Poole, C. M. and Walston, J. (2001) Cambodia's northern plains: heartland of the Giant Ibis. *World Birdwatch* 23 (4): 15-19.

Goes, F. (2001) L'Ibis Géant, un oiseau légendaire et misanthrope. *Cambodia Bird News* 7: 2-6. (In French.)

Goes, F. and Davidson, P. eds. (2001) Recent sightings. *Cambodia Bird News* 7: 38-45.

Goes, F. and Davidson, P. eds. (2002) Recent sightings. *Cambodia Bird News* 9: 47-59.

Prum Sovanna (2001) *Mammal list from Preah Vihear province*. Unpublished report to the Wildlife Conservation Society Cambodia Program.

Tan Setha (2001) *Bird checklist from Preah Vihear province*. Unpublished report to the Wildlife Conservation Society Cambodia Program.