


**ទន្លេសេសាន**

A1, A2 & A4i

- ទេត្ត** : ស្ទឹងត្រែង និង រតនគីរី
- ស្រុក** : សៀមបាំង សេសាន រឿនសៃ តាវែង និង អណ្តូងមាស
- ផ្ទៃបី (ហិកតា)** : ២០.៥០៤
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ៤៣ ដល់ ១៦៦
- កូអរដោនេចំណុចណាវាទ** : ១៣° ៥០' ជ ១០៧° ២៣' ក



**ការពិពណ៌នាទីកន្លែង**

តំបន់ IBA នេះ រួមមានទន្លេសេសានទាំងអស់លាតសន្ធឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង រុក្ខជាតិប្រព័ន្ធទន្លេ ចាប់ពីកន្លែងប្រសព្វ ត្រង់ទន្លេសេសានរហូតដល់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជា-វៀតណាម ។ ទន្លេសេសានមានប្រវែងទទឹងចាប់ពីប្រហែល១៥០ម៉ែត្រនៅ ផ្នែកខាងលើរហូតដល់៣០០ម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងក្រោម ។ ភាគច្រើនបំផុតរបស់ទន្លេនេះគ្របដណ្តប់ដោយដីខ្សាច់ និង គ្រួសនៅ ផ្នែកខាងក្រោមបំផុតរបស់ទន្លេត្រង់ចំណុចខាងក្រោមភូមិខ្សាច់ថ្មីសម្បូរដោយផ្ទាំងថ្ម ។ ទន្លេនៅផ្នែកខាងលើសម្បូរទៅដោយគ្រួស រួមជាមួយនឹងព្រៃគុម្ពាតទាបៗ រីឯទន្លេនៅផ្នែកខាងក្រោមសម្បូរទៅដោយដីខ្សាច់ មានព្រៃគុម្ពាតដុះតិចតួច ឬ គ្មានតែម្តង ។ រុក្ខជាតិប្រព័ន្ធទន្លេគ្របដណ្តប់លើសលប់ដោយព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និង ព្រៃបោះដៃលុះនៅជាប់បន្ទាប់ពីព្រៃពាក់កណ្តាល ស្រោងតាមមាត់ទន្លេ ។ រុក្ខជាតិប្រព័ន្ធទន្លេជាទូទៅមានការថយចុះគ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមដងទន្លេ ដោយសារការធ្វើកសិកម្ម ពនេចរ ។

តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ការនៅសេសសល់ពពួកសត្វស្លាបរកស៊ី ស្នាក់អាស្រ័យ និង ពងកូនតាមប្រព័ន្ធទន្លេបានល្អបំផុត ដែល ពីមុនពួកវាមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមបណ្តាដងទន្លេដែលមានដីទំនាបៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ពពួកសត្វទាំងនោះ រួមមានត្រដេរីវិចទន្លេ ទន្លឹតទន្លេ ជង្គង់ក្រាស់ចំពុះខ្មៅ និង រំពេទន្លេ ដែលតំបន់នេះបានទ្រទ្រង់លើសពី១% នៃចំនួនសត្វជីវភូមិ សាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលពីមុនមាន២% ។ លើសពីនេះទៀត តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ប្រភេទខ្ទប់ដីមេកង្កុល ដែលបច្ចុប្បន្ន ប្រភេទនេះគេបានចាត់ទុកថា ជាប្រភេទដែលមាននៅតែក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្កផ្នែកខាងលើ និង ដៃសំខាន់ៗរបស់វ៉ាប៉ូណ្លោះ ។ តំបន់នេះ អាចចាត់ទុកជាតំបន់ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ទីកន្លែងពងកូនសម្រាប់រំពេពោះខ្មៅទោះជាវាមានប្រ ហែលមួយ ឬ ពីរគូក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និង ដោយមានការផ្លាស់ប្តូររបបទឹកហូរដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍គំរោងវារីអគ្គិសនី នៅក្នុងទន្លេប៉ែកខាងលើ ប្រភេទនេះនឹងឈានទៅរកការផុតពូជ ។

**ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ**

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ IBA
ខ្ទប់ដីមេគង្កលើ	Mekong Wagtail	<i>Motacilla samveasnae</i>	A1 A2
ក្តាតជើង	White-rumped Vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	A1
ក្តាតភ្លើង	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	A1
ត្រដក់តូច	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos javanicus</i>	A1

ទន្លឹតទន្លេ	Small Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	A4i
រំពេពោះខ្មៅ	Black-bellied Tern	<i>Sterna acuticauda</i>	A1
រំពេទន្លេ	River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>	A4i
អកត្រីក្បាលប្រផេះ	Grey-headed Fish Eagle	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	A1

**ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់ឆ្នួលជាក់សាក់**

មានសត្វស្លាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃស្រោង និង ព្រៃប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃរោះ (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

**ប្រភេទធានថាតិចតួលរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក**

ស្វាត្តាម និង ស្វាព្រាម ។

**ប្រភេទអណ្តើក កន្ទាយ និង ក្រពើតិចតួលរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក**

ក្រពើទន្លេ (ក្រពើត្រី) និង អណ្តើកសោមញី ។

**ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះ**

ការគំរាមកំហែងចម្រុះលើជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ IBA នេះ រួមមានការប្រមាញ់ដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការប្រមូលយកពងកូន និង ការរំខានដោយសារសកម្មភាពមនុស្សនៅលើវាលខ្សាច់ ដែលអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការពងកូនរបស់ប្រភេទសត្វស្លាបពងកូនលើវាលខ្សាច់ ។ ការគំរាមកំហែងមួយផ្សេងទៀតនោះ គឺការថយចុះ និង ការបាត់បង់ព្រៃឈើដុះតាមប្រព័ន្ធទន្លេដោយសារការកាប់រំលំ និង ការរានយកដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម ។ ការគំរាមកំហែងលើសត្វនេះទៀត គឺបណ្តាលមកពីការអភិវឌ្ឍន៍គំរោងវារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ និង គ្រោងធ្វើបន្ថែមនៅក្នុងទន្លេផ្នែកខាងលើក្នុងប្រទេសវៀតណាម ។ មានការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ការប្រែប្រួលរបបទឹកហូរដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីមានស្រាប់គឺកំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាអវិជ្ជមានដល់ពពួកសត្វស្លាបរកស៊ី ស្នាក់អាស្រ័យ និង ពងកូនតាមប្រព័ន្ធទន្លេ ដោយសារមានការលិចលង់យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបានបំផ្លាញបំបុករបស់សត្វ និង មានការប្រែប្រួលដំណើរការនៃកំណកដី ដែលនាំឱ្យមានការថយចុះនូវទឹកកន្លែងពងកូនរបស់ពួកវា ។

**អនុសាសន៍**

ការប្រឹងប្រែងត្រូវតែធ្វើឡើង ដើម្បីការពារប្រភេទសត្វស្លាបដែលពងកូនលើវាលខ្សាច់ ខណៈដែលពួកវាកំពុងពងកូន ។ កិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍អាចបង្កើតឡើងតាមភូមិនិមួយៗ ដើម្បីកុំឱ្យតំបន់ទាំងនោះមានការរំខាន ។

ការអភិរក្សទន្លេសេសាសគួរតែធ្វើឡើងនៅតាមបណ្តោយប្រព័ន្ធទន្លេទាំងអស់ ដោយផ្តោតលើផ្នែកតូចៗដាច់ៗពីគ្នា ដែលអាចទទួលបានផលវិបាកនាំឱ្យមានភាពមហន្តរាយ ។

ការបង្កើតភូមិថ្មីៗ និង ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មតាមដងទន្លេមិនគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើយ ហើយផ្នែកសំខាន់ៗដែលមានព្រៃឈើប្រព័ន្ធទន្លេ គួរតែការពារឱ្យបានតឹងរឹងពីការកាប់រំលំ និង ការធ្វើកសិកម្មពនេចរ ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគួរធ្វើឡើង ដោយផ្តោតលើផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍន៍គំរោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេសេសាសលើពពួកសត្វស្លាប ជាពិសេសប្រភេទដែលពងកូនលើវាលខ្សាច់ ។

**ឯកសារយោង**

Davidson, P., Poole, C. M. and Duckworth J. W. (2001) Mekong Wagtail (*Motacilla samvaesnae*): the great river's only known avian endemic. *Bull. Oriental Bird Club* 34: 56-59.

Davies, J. D. (1994) *Wetland surveys in Cambodia to identify sites of international importance*. Kuala Lumpur: Asian Wetland Bureau.

Duckworth, J. W., Alström, P., Davidson, P., Evans, T. D., Poole, C. M., Tan Setha and Timmins, R. J. (2001) A new species of wagtail from the lower Mekong basin. *Bull. Brit. Ornith. Club* 121(3): 152-182.

Goes, F. (1999) Notes on selected bird species in Cambodia. *Forktail* 15: 25-27.

Mundkur, T., Carr, P., Sun Hean and Chhim Somean (1995) *Surveys for large waterbirds in Cambodia, March-April 1994*. Cambridge, UK: IUCN/SSC.

Poole, C. M. Duckworth, J. W. and van Zalinge, N. J. (in prep.) Bird observations from the Mekong and major tributaries in north-east Cambodia, 1998-2000.

Tan Setha (2002) Mekong Wagtail: a species new to science discovered in northeast Cambodia. *Cambodia Bird News* : 9: 14-17.

Timmins, R. J. and Men Soriyun (1998) *A wildlife survey of the Tonle San and Tonle Srepok river basins in north-east Cambodia*. Hanoi and Phnom Penh: Fauna & Flora International and the Wildlife Protection Office.

Thomas, W.W. 1964. *A preliminary list of the birds of Cambodia*. Unpubl.

van Zalinge, N. J., Poole, C. M., Duckworth, J. W. and Goes, F. (2002) Waterbird counts on the Mekong, Sekong, Sesan and Srepok rivers. *Cambodia Bird News* 9: 18-29.