

តំបន់កណ្តាលនៃជួរភ្នំក្រវាញ

A1 & A2

- ទេត្ត** : ពោធិសាត់ កំពង់ស្ពឺ និង កោះកុង
- ស្រុក** : ក្រវាញ ឱរ៉ាល់ វាលវែង និង ថ្មបាំង
- ផ្ទៃដី (ហិកតា)** : ៣៥៥.៣៦២
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ៣៥០ ដល់ ១.៥៣៩
- កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល** : ១១° ៥៣' ជ ១០៣° ៣២' ក



ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ IBA នេះ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញរវាងតំបន់ IBA ភ្នំសំកុះ (KH012) និង ភ្នំឱរ៉ាល់ (KH014) ។ តំបន់នេះរួមមានតំបន់ព្រៃស្រោង និង ព្រៃបោះនៃជួរភ្នំក្រវាញ ដែលមានរយៈកំពស់លើសពី៤០០ម៉ែត្រធៀបនឹងនីវ៉ូសមុទ្រ ដែលគេគិតថា ជារយៈកំពស់មួយទាបជាងរយៈកំពស់របស់តំបន់ក្រុងសំពៅរស់នៅ ។ តាមលក្ខណៈសណ្ឋានដី តំបន់នេះសម្បូរទៅដោយភ្នំ ដែលមានកំពូលទាបជាងតំបន់ IBA ផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្បែរៗ ។ រុក្ខជាតិក្នុងតំបន់នេះគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃស្រោងតំបន់ទំនាប ជាមួយនឹងព្រៃស្រោងតំបន់ភ្នំដែលមានរយៈកំពស់លើសពី១.០០០ម៉ែត្រ ។ តំបន់ IBA នេះបានទ្រទ្រង់ប្រភេទក្រុងសំពៅដែលជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោមប្រភេទមានដងកំណត់នៅតាមជួរភ្នំប្រទេសកម្ពុជា និង ប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះ ។ លើសពីនេះទៀត វិសាលភាពយ៉ាងធំនៃតំបន់ព្រៃស្រោងព្រមទាំងនៅក្នុងតំបន់ IBA នេះ ធ្វើឱ្យវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិរក្សនៃប្រភេទកេងកងធំ ។ យោងតាមកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងប្រភេទព្រៃស្រោង និង ត្រយឹងចំកំកសត្រូវបានកត់ត្រានៅតាមបណ្តោយទន្លេក្នុងតំបន់ IBA នេះនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនបានដឹងនៅឡើយ ។ តំបន់នេះភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សជួរភ្នំក្រវាញ ។

ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ IBA
កេងកងធំ	Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	A1
ក្រូចសំពៅ	Chestnut-headed Partridge	<i>Arborophila cambodiana</i>	A1

ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់

មានសត្វស្លាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃតំបន់ភ្នំខ្ពស់ៗ (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

ប្រភេទពាសវារីចម្រុះរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក

រញ្ជីប្រផេះ ស្វាគ្រោស ស្វាត្តាម ស្វាអង្កត់ និង ទោចម្ពុដ ។

ដំរី និង ពពួកក្រចកដំរីចម្រុះរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក

ដំរី ខ្លឹង និង កែវ ។

ប្រភេទអណ្តើក កន្ទាយ និង ក្រពើចម្រុះរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក

ក្រពើទន្លេ (ក្រពើត្រី) អណ្តើកតិកកាល់បន្តាមួយ និង កន្ទាយអាស៊ី ។

ការពិភាក្សាចំពោះលើដីចំរុះ

ការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីៗ និង ផ្លូវក្នុងតំបន់ព្រៃសម្បទានគឺធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចេញ ចូលទៅកាន់តំបន់នោះ សម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិរន្តរ៍របស់ជនភៀសខ្លួន ជាពិសេសមកកាន់តំបន់ទំនាប ដែលនាំឱ្យមានការប្រែក្លាយតំបន់ដីព្រៃឈើទៅ ជាតំបន់កសិកម្ម ។ ការប្រមាញ់កើតមានច្រើនក្នុងតំបន់នេះដោយសារមានផ្លូវថ្មីៗគឺជាបញ្ហាមួយផងដែរចំពោះសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទដែលផលប្រមាញ់ភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិ ។ ដោយឡែកការប្រមាញ់សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ពិសេសសម្រាប់ នាំចេញទៅប្រទេសថៃមានការកើនឡើងព្រមទាំងការរុករកប្រភេទខ្លឹមថ្មី (Aquilaria species) ។

អនុសាសន៍

ការអនុវត្តផ្សារលើការបង្ក្រាបការបរបាញ់ និង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃ ព្រមទាំងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រូវ តែត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំព្រួញទាំងមូល ។

ការអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយនៅក្នុងតំបន់ដោយគ្មានការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវតែហាមឃាត់ ឬ បញ្ឈប់តែម្តង ។ ការទន្ទ្រានយកដី និង ការរានដីព្រៃឈើសម្រាប់ជាគោលបំណងកសិកម្មមិនគួរអនុញ្ញាតឡើយ ។

ឯកសារយោង

Eames, J. C. and Steinheimer, F. (2000) Birds. In J. C. Daltry and Momberg, F. eds. *Cardamom mountains biodiversity survey 2000*. Hanoi and Phnom Penh: Fauna & Flora International and the Wildlife Protection Office.
Engelbach, P. (1952) Notes de voyage dans les Monts des Cardamomes (Cambodge). *L'Oiseau et la Revue Francaise d'Ornithologie*. 22: 283-302.
Swan, S. R. and Long, B. (2002) Birds. In J. C. Daltry ed. *Social and ecological surveys of Phnom Aural Wildlife Sanctuary, Cardamom mountains, Cambodia*. Phnom Penh: Fauna & Flora International Cambodia Program me.