ស្ទោង/ជីក្រែង/កំពង់ស្វាយ A1 & A3



ខេត្ត	:	កំពង់ធំ និង សៀមរាប
ស្រុក	:	ស្ទោង ជីក្រែង និង កំពង់ស្វាយ
ផ្ទៃដី (ហិកតា)	:	៥៣.៥៤៣
រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)	:	៤ ដល់ ១៧
កូអរដោនេចំណុចកណ្ដាល	:	១២°៥៧' ជ ១០៤°២៥' ក

ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ IBA នេះ រួមមានតំបន់វាលស្មៅធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់លិចទឹកបឹងទន្លេសាប ។ រុក្ខជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះមានលក្ខណៈជាស្មៅទាប ខ្ពស់ ដុះលាយឡំជាមួយព្រៃគុម្ពោតក្រាស់ៗ វាលស្រែ និង តំបន់ដីសើមមាននៅរាយប៉ាយក្នុងតំបន់នេះទាំងមូល ។ នៅរដូវវស្សា គេធ្វើស្រូវនៅតាមជាយតំបន់នេះនៅប៉ែកខាងជើងជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ៦A ។ តំបន់វាលស្មៅលិចទឹកតាមរដូវកាលបានទ្រទ្រង់ដង់ស៊ីតេនៃចំនួនសត្វខ្សឹបច្រើនជាងគេបំផុតដែលបានរកឃើញកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ បឹង និង ត្រពាំងតូចៗទាំងនោះគឺជាតំបន់រកចំណីរបស់សត្វស្លាបទឹកធំៗមួយចំនួន ដែលបានបែកខ្ញែកពីតំបន់ពងកូននៅបឹងទន្លេសាប រួមមានរនាលពណិ និង ត្រដក់តូច ។ តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ផងដែរនូវប្រភេទសត្វអន្តោប្រវេសន៍ ដូចជាចាបដូនតាវាលស្រែ ព្រមទាំងមួយចំនួនតូចនៃប្រភេទអកខ្មៅដីសើម ។

ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យIBA
ក្រៀល	Sarus Crane	*Grus antigone*	A1
ខ្សឹប	Bengal Florican	*Houbaropsis bengalensis*	A1
ចាបដូនតាវាលស្រែ	Manchurian Reed Warbler	*Acrocephalus tangorum*	A1
ចាបពួកទ្រូងលឿង	Asian Golden Weaver	*Ploceus hypoxanthus*	A1
ត្រដក់តូច	Lesser Adjutant	*Leptoptilos javanicus*	A1
ត្រយ៉ងខ្លួន ស	Black-headed Ibis	*Threskiornis melanocephalus*	A1
ទុងប្រផេះ	Spot-billed Pelican	*Pelecanus philippensis*	A1
រនាលពណិ	Painted Stork	*Mycteria leucocephala*	A1
អកខ្មៅដីសើម	Greater Spotted Eagle	*Aquila clanga*	A1

ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់

មានសត្វស្លាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនាបវាលស្មៅ (សូមមើល តារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចំរុះ

ការប្រមាញ់គឺជាការគំរាមកំហែងមួយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះសត្វខ្សឹប និង សត្វស្លាបទឹកនៅក្នុងតំបន់ IBA នេះ ។ នៅក្នុងរដូវប្រាំង ពេលទឹកជំនន់បានស្រកចុះមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់នេះ ដើម្បីធ្វើការនេសាទត្រី ច្រូតស្មៅកាប់អុស ធ្វើដំណាំដាំដុះផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ដីសើម និង ឃ្វាលគោ ក្របីរាប់រយក្បាល ។ សកម្មភាពទាំងនេះបណ្តាលឱ្យមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល រីឯស្រូវឡើងទឹកត្រូវបានគេធ្វើនៅប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់នេះ ។ ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចំរុះនៅក្នុងតំបន់នាពេលអនាគតគឺការប្រែក្លាយតំបន់វាលស្មៅទៅជាតំបន់ធ្វើស្រូវឡើងទឹក ។

អនុសាសន៍

ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ និង ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងគួរតែធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគំរូជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់ IBA ស្ទឹងសែន / សន្ទុក / បារ៉ាយណ៍ (KH021)។ ការងារនេះគួរផ្តោតលើការត្រួតពិនិត្យនៃការបរបាញ់ និង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រភេទសត្វសំខាន់ៗ ពិសេសសត្វខ្សឹប និង សត្វស្លាបទឹកធំៗ ព្រមទាំងពិនិត្យមើលអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគួរធ្វើឡើងបន្ថែមទៀតលើសារៈសំខាន់នៃអេកូឡូស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងតំបន់ស្មៅលិចទឹក និង តំបន់ស្រូវឡើងទឹក ជាពិសេស ចំពោះការអភិរក្សសត្វខ្សឹប ។

ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មបន្ថែមទៀតណាមួយ ជាពិសេសការពង្រីកផ្ទៃដីស្រូវឡើងទឹកមិនគួរអនុញ្ញាតឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការវាយតំលៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និង ការស្វែងយល់នៃការជះឥទ្ធិពលលើតំបន់អេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ ដែលសត្វខ្សឹបមានទំនាក់ទំនងជាមួយនោះទេ ។

ឯកសារយោង

Goes, F. and Davidson, P. eds. (2002) Recent sightings. *Cambodia Bird News* 9: 47-59.

Pech Bunnat (2002) *Field survey of eastern Tonle Sap in Siem Reap and Banteay Meanchey provinces*. Unpublished report to the Wildlife Conservation Society Cambodia Program and the BirdLife International Vietnam Program me.

Seng Kim Hout *et al.* (2002) *Field survey of seasonally flooded wetlands located in the east of Tonle Sap Lake in Kampong Thom and Siem Reap provinces.* Unpublished report to the Wildlife Conservation Society Cambodia Program and the BirdLife International Vietnam Programme.