

ស្មោង/ប្រាសាទបាឡាំង

A1 & A3

- ខេត្ត** : កំពង់ធំ
- ស្រុក** : ស្មោង ប្រាសាទបាឡាំង និង កំពង់ស្វាយ
- ផ្ទៃដី (ហិកតា)** : ១០០.៦៧៥
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ៤ ដល់ ៧០
- កូអរដោនេចម្រុកឈ្នួល** : ១៣^០១' ជ ១០៤^០ ៤៣' ក



ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ IBA នេះ ស្ថិតនៅភាគអគ្នេយ៍នៃតំបន់ IBA ស្មោង / ជីក្រែង / កំពង់ស្វាយ (KH016) ហើយរួមមានតំបន់ព្រៃ រហូតដល់ជាមួយនឹងតំបន់វាលស្មៅ បឹង និង អូរមានទឹកតាមរដូវកាល ។ តំបន់ IBA នេះ គឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ ពងកូនរបស់សត្វឱបដែលគេបានរកឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ឱបបានមករកស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះនៅពេល ដែលតំបន់ពងកូនស្ថិតក្នុងតំបន់លិចទឹកបឹងទន្លេសាបត្រូវលិចលង់អស់ ។ លើសពីនេះទៀត ប្រភេទទីជំរកតំបន់ដីសើមក្នុងតំបន់ នេះ ក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាតំបន់រកស៊ីរបស់ពពួកសត្វស្លាបទឹកធំៗមួយចំនួនផងដែរ ដូចជារនាសពណ៌ សត្វកស ចង្កៀលខ្យង និង ត្រដក់តូច ។

ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យIBA
ឱប	Bengal Florican	<i>Houbaropsis bengalensis</i>	A1
ត្រដក់តូច	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos javanicus</i>	A1
រនាសពណ៌	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	A1

ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់

មានសត្វស្លាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនាបវាលស្មៅ (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះ

ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ IBA នេះមិនទាន់បានវាយតម្លៃឱ្យបានល្អិតល្អន់នៅឡើយទេ ។ ទោះ ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការគំរាមកំហែងមួយនៃការគំរាមកំហែងចម្រុះ គឺគេគិតថា ជាការបរាជ័យសត្វស្លាបដោយអ្នកនេសាទនៅ ពេលដែលពួកគាត់បានជួបដោយចៃដន្យ ខណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងឆ្លុះត្រីក្នុងរដូវវស្សា ។ កាលពីអតីតកាល មានអ្នកប្រមាញ់ មួយចំនួនមានបំណងបរាជ័យសត្វឱបនៅក្នុងតំបន់នេះ ។

អនុសាសន៍

ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ និង ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងតាមមូលដ្ឋានគួរតែធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើកំរិតទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង តំបន់ IBA ស្ទឹងសែន / សន្តុក / បារាយណ៍ (KH021) ។ ការងារនេះផ្តោតលើការត្រួតពិនិត្យការបរាជ័យ និង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ប្រភេទសត្វសំខាន់ៗ ជាពិសេសឱ្យីប និង សត្វស្លាបទឹកធំៗ ព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ។

ឯកសារយោង

Hong Chamnan (2002) *Field survey for Bengal Florican in the wet season in Kampong Thom province.*
Unpublished report to the Wildlife Conservation Society Cambodia Program.