

# ស្ទឹងសែន/សន្ទុក/បារាយណ៍

A1, A3 & A4i

- គេហ** : កំពង់ធំ កំពង់ចាម និង កំពង់ឆ្នាំង
- ស្រុក** : កំពង់ស្វាយ សន្ទុក ស្ទឹងសែន បារាយណ៍ បាធាយ ជលគិរី និង កំពង់ឡែង
- ផ្ទៃបី (ហិកតា)** : ១០៩.៣៨១
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ៤ ដល់ ១៦
- កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល** : ១២°២៥'ជ ១០៤°៥៣'ក



## ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ IBA នេះ ស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃទីរួមខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងតំបន់លិចទឹកបឹងទន្លេសាប ។ តំបន់នេះ គឺជាតំបន់មួយដែលមានវាលស្មៅលិចទឹកតាមរដូវកាលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់វាលទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លេសាប ដែលគេបានធ្វើស្រូវឡើងទឹកនៅចុងតំបន់ប៉ែកខាងកើត និង ខាងជើង ។ ប្រភេទទីជីវកម្មទាំងនោះដុះរាយឡើយជាមួយព្រៃគុម្ពាត វាលភក់មានឈូកដុះ និង រុក្ខជាតិកក់ បបូស ព្រៃង ហើយនៅរដូវប្រាំង មានបឹងតូច ធំជាច្រើន ។ កំពស់ទឹកមានកំរិតខ្ពស់នៅរដូវវស្សា (ពីខែសីហា-តុលា) តំបន់នេះទាំងមូលត្រូវបានលិចទឹក ។ ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងបឹងទន្លេសាប ដែលកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យជាតំបន់ការពារនៅឆ្នាំ ១៩៩៣ និង តំបន់បម្រើយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប ។

តំបន់ IBA នេះ គឺជាទីកន្លែងពងកូនដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សត្វឱប ក្នុងរដូវប្រាំង (ពីខែ ធ្នូ-ឧសភា) ។ នៅក្នុងរដូវវស្សា (ពីខែ ឧសភា-កក្កដា) មានសត្វស្លាបទឹកមួយចំនួនបានមករកស៊ី និង ស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងតំបន់នេះរួមមានត្រដក់ រនាណពណ៌ និង ចង្កៀលខ្យង ។ លើសពីនេះទៀត តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ចាប់ដូនតារាល់ស្រែជាច្រើនក្បាលព្រមទាំងអកខ្មៅដើមមួយចំនួនតូច និង ឥន្ទ្រីយ៍ ដែលជាពពួកអន្តោប្រវេសន៍ ។ សំខាន់បំផុតនោះ តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ចំនួនត្រយឹងចំកក់សជាច្រើនក្បាល ដែលគេបានកត់ត្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះ គឺបានសង្កេតឃើញនៅទីនោះនៅឆ្នាំ ១៩៩៩ ។

## ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ IBA
ក្រៀល	Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	A1
ឱប	Bengal Florican	<i>Houbaropsis bebgalensis</i>	A1
ចាប់ដូនតារាល់ស្រែ	Manchurian Reed Warbler	<i>Acrocephalus tangorum</i>	A1
ចាប់ពួកទ្រូងលឿង	Asian Golden Weaver	<i>Ploceus hypoxanthus</i>	A1
ចង្កៀលខ្យង	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	A4i
ត្រដក់តូច	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos javanicus</i>	A1
ត្រដក់ធំ	Greater Adjutant	<i>Leptoptilos dubius</i>	A1 A4i
ត្រយឹងខ្លួន ស	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	A1
ត្រយឹងចំកក់ ស	White-shouldered Ibis	<i>Pseudibis davisoni</i>	A1

ទុងប្រផេះ	Spot-billed Pelican	<i>Pelecanus philippensis</i>	A1
រនាវពណ៌	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	A1
រនាវ ស	Milky Stork	<i>Mycteria cinerea</i>	A1
អកខ្មៅដីសើម	Greater Spotted Eagle	<i>Aquila clanga</i>	A1
អកត្រីក្បាលប្រផេះ	Grey-headed Fish Eagle	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	A1
អង្កត់ខ្មៅ	Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	A1
ឥន្ទ្រីយ័	Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	A1

**ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់**

មានសត្វស្នាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃរេបេ និង មួយប្រភេទរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនាបវាលស្មៅ (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

**ប្រភេទធានជាតិទទួលរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក**

ស្វាគ្គាម និង ស្វាព្រាម ។

**ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះ**

ទោះជាមិនមានលំនៅដ្ឋានរបស់មនុស្សជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅលិចទឹកតាមរដូវកាលក៏ដោយ មានភូមិ និង ដីស្រែមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់លិចទឹកនោះដែរ ។ ក្នុងរដូវប្រាំងនៅពេលដែលទឹកបានស្រកចុះ មានប្រជាជនជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់លិចទឹកពិតប្រាកដៗដែលស្ថិតនៅប្រហែលជាង៥០គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីធ្វើការនេសាទ ច្រូតស្មៅ កាប់អុស និង ដាំដំណាំនៅក្នុងតំបន់ដីសើម ព្រមទាំងឃ្វាលគោ ក្របីរាប់រយក្បាល ។ សកម្មភាពនេះបណ្តាលឱ្យមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំង ។ ស្រូវឡើងទឹកត្រូវបានគេធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប៉ែកខាងជើង និង ខាងកើតតំបន់ IBA នេះ ហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះ កន្លែងជាច្រើនក្នុងតំបន់ត្រូវបានគេធ្វើការរុករានដោយស្រាក់ទ័រ ដែលបង្កឱ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សត្វខ្សឹបកំពុងធ្វើសំបុកពងកូន ដោយសារការរំខាន និង ការបំផ្លាញសំបុក ។ ការគំរាមកំហែងនាពេលអនាគតគឺជាការប្រែក្លាយតំបន់វាលស្មៅបន្តទៀតទៅជាតំបន់ស្រូវឡើងទឹក ។

ការគំរាមកំហែងចម្រុះមួយទៀតគឺជាការបរិច្ចាគសត្វសម្រាប់ទាំងធ្វើម្ហូប និង លក់ដូរ ដែលបានប៉ះពាល់ដល់សត្វស្នាបទឹក និងខ្សឹប ។ ការប្រមាញ់បានធ្វើឱ្យចំនួនសត្វខ្សឹបថយចុះយ៉ាងខ្លាំងការពិរយៈពេលកន្លងទៅថ្មីនេះ ។ ទោះជាយ៉ាងក្តី សកម្មភាពនៃការអភិរក្សអស់រយៈពេលជាងពីរឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានធ្វើឱ្យមានការកាត់បន្ថយការបរិច្ចាគសត្វនៅក្នុងតំបន់នេះ ។

**អនុសាសន៍**

ការអនុវត្តន៍ច្បាប់នាពេលថ្មីនេះដែលធ្វើឡើងដោយផ្តោតលើការបរិច្ចាគ និង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រភេទសត្វសំខាន់ៗ ជាពិសេសសត្វខ្សឹប និង សត្វស្នាបទឹកធំៗផ្សេងទៀតគួរតែពង្រឹងឱ្យបានល្អ ។

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងដល់សហគមន៍ពេលថ្មីដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់គ្រួសក្រោម និង តំបន់ក្បែរគួរតែពង្រីកឱ្យពាសពេញតំបន់នេះទាំងមូល ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគួរតែធ្វើឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់អេកូឡូស៊ីនៃតំបន់វាលស្មៅលិចទឹកតាមរដូវកាល និង តំបន់ស្រូវឡើងទឹក ជាពិសេសចំពោះការអភិរក្សសត្វខ្សឹប ។

ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មណាមួយ ជាពិសេសការពង្រីកផ្ទៃដីស្រូវឡើងទឹកមិនគួរធ្វើឡើងដោយគ្មានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននោះទេ និង ការស្វែងយល់ឱ្យបានស៊ីជម្រៅដល់ប្រភេទទីជម្រកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឱ្យប ដោយសារការប្រែក្លាយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិទៅជាតំបន់កសិកម្ម ។

**ឯកសារយោង**

Davidson, P. (2001) A further twelve new species for Cambodia. *Cambodia Bird News* 7: 26-35

Goes, F. ed. (2000) Recent sightings. *Cambodia Bird News* 6: 44-51.

Goes, F. and Davidson, P. eds. (2002) Recent sightings. *Cambodia Bird News* 9: 47-59.

Goes, F., Hong Chamnan, Davidson, P. and Poole, C. M. (2001) *Bengal Florican* *Houbaropsis bengalensis conservation in Kampong Thom province, Cambodia*. Phnom Penh: Wildlife Conservation Society.

Sam Veasna (1999) *Survey for Sarus Crane and other endangered bird species in southern Kampong Thom province, Cambodia*. Unpublished report to the Oriental Bird Club.

Seng Kim Hout et al. (2002) *Field survey of seasonally flooded wetlands located in the east of Tonle Sap Lake in Kampong Thom and Siem Reap provinces*. Unpublished report to the Wildlife Conservation Society Cambodia Program and the BirdLife International Vietnam Programme.