

ទន្លេមេគង្គពីខេត្តក្រចេះដល់ប្រទេសឡាវ

A1 & A2

- ខេត្ត** : ស្ទឹងត្រែង និង ក្រចេះ
- ស្រុក** : ថាឡាបរិវាត់ ស្ទឹងត្រែង សៀមបូក និង សម្បូរ
- ផ្ទៃដី (ហិកតា)** : ៨៣.៥០១
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ២១ ដល់ ១៨៩
- កូអរដោនេចំណុចឈ្លាន** : ១៣^០ ១៧^៨ ជ ១០៥^០ ៥៨^៨ ក



ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ IBA នេះ រួមមានទន្លេមេគង្គ និង រុក្ខជាតិដុះជាប់ៗមាត់ទន្លេ ពីទីរួមខេត្តក្រចេះរហូតដល់ព្រំដែនប្រទេសឡាវ ។ ទន្លេមេគង្គមានសភាពខុសគ្នានៅតាមបណ្តោយទន្លេនៃការលាតសន្ធឹងរបស់វា ផ្នែកខ្លះមានចង្កូរផ្លូវទឹកតែមួយដែលមានទទឹងរហូតដល់១.៥ម៉ែត្រ និង ពោរពេញទៅដោយផ្ទៃទឹក រីឯផ្នែកខ្លះផ្សេងទៀតមានចង្កូរផ្លូវទឹកហូរជាច្រើន និង កោះតូចៗ ។ នៅកន្លែងដែលមានចង្កូរផ្លូវទឹកហូរច្រើនមានរុក្ខជាតិដុះនៅលើកោះតូចៗទាំងនោះយ៉ាងលើសលប់ និង លិចទឹកតាមពេលវេលា ហើយព្រៃក្តៅ និង ដើមឈើមួយចំនួនដុះក្នុងលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំក្នុងទន្លេ ដែលបានលិចទឹកនៅតែចុងៗស្ទើរតែពេញមួយរដូវវស្សា ហើយប្រភេទទឹកជ្រកសំខាន់ៗផ្សេងទៀត រួមមានវាលខ្សាច់ និង ថ្មនៅក្នុងទន្លេ ។ ទោះជាមានការថយចុះនៃព្រៃឈើដែលដុះតាមប្រព័ន្ធទន្លេខ្លះក៏ដោយ ក៏តំបន់មួយចំនួននៅមានព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និង ព្រៃរេប្រេនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អនៅត្រង់ព្រំប្រទល់រវាងខេត្តក្រចេះ និង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ បន្ទាប់មកពីទន្លេ ព្រៃឈើមានលក្ខណៈជាព្រៃរេប្រេន ហើយនៅតាមមាត់ទន្លេមានការបោះទឹកាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីធ្វើកសិកម្មពនេចរ ។ ទន្លេមេគង្គចាប់ពីត្រង់ចំណុច ៥គីឡូម៉ែត្រ ខាងជើងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងរហូតដល់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជា-ឡាវត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាតំបន់រ៉ាមសារ ។

តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ប្រភេទខ្ពស់ដ៏មេគង្គមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោក ដែលថ្មីៗនេះគេហៅប្រភេទនេះថាជាប្រភេទមានតែនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើ និង ដៃសំខាន់ៗរបស់វា ។ លើសពីនេះទៀត តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់នូវពពួកនៅតាមតំបន់ទន្លេ ដែលចំនួនវាបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីអគ្នេយ៍ រួមមានត្រដេវិចទន្លេ សត្វជង្គង់ក្រាស់ចំពុះខ្មៅ និង រំពេទន្លេ ក្រៅពីនេះនៅមានប្រភេទទទួលរងការគំរាមកំហែង និង ជិតរងគ្រោះក្នុងពិភពលោក ដែលគេបានកត់ត្រាពីតំបន់នេះដូចជាត្នាតផេះ ត្នាតភ្លើង និង ស្មៅព្យ ។ ចំនួនតិចតួចនៃប្រភេទត្រយ៉ង់ចំកំសត្រូវបានកត់ត្រានៅតាមបណ្តោយទន្លេត្រង់ផ្នែកដែលមានព្រៃឈើដុះ ។ ជាចុងក្រោយ តំបន់នេះអាចជាតំបន់មួយដែលនៅសេសសល់ក្រោយគេក្នុងចំណោមតំបន់ទាំងឡាយក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន ដែលបានទ្រទ្រង់ប្រភេទរំពេពោះខ្មៅ ទោះជាមានពពួកមានតិចតួច និង មានការបញ្ជាក់ពីការពងកូននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយ ។ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ តំបន់នេះបានទ្រទ្រង់ប្រភេទរំពេចំពុះវែងខ្លី ដែលមានការកត់ត្រាចុងក្រោយជាច្រើននៅតាមបណ្តោយទន្លេក្នុងឆ្នាំ ១៩៣២ ហើយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលថ្មីៗ ប្រភេទនេះមិនបានជួបប្រទះឡើយទំនងជាវាបានផុតពូជពីទន្លេមេគង្គទៅហើយ ។

ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ IBA
ខ្នុរបដិមេគង្គលើ	Mekong Wagtail	<i>Motacilla samveasnae</i>	A1 A2

ត្នាតជើង	White-rumped Vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	A1
ត្នាតក្លើង	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	A1
ត្រយឹងចំកក ស	White-shouldered Ibis	<i>Pseudibis davisoni</i>	A1
ទន្លឹតទន្លេ	Small Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	A4i
រំពេពោះខ្មៅ	Black-bellied Tern	<i>Sterna acuticauda</i>	A1
ស្មៅញាញ	Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	A1
អកត្រីក្បាលប្រផេះ	Grey-headed Fish Eagle	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	A1

ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់

មានសត្វស្លាបពីរប្រភេទរស់ក្នុងប្រភេទព្រៃរោះ (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

ប្រភេទធានីជាតិទទួលរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក

ស្វាក្តាម ។

ប្រភេទអណ្តើក កន្ទាយ និង ក្រពើទទួលរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក

ក្រពើទន្លេ (ក្រពើត្រី) និង កន្ទាយក្បាលបង្កែប ។

ការគំរាមកំហែងលើជីវចម្រុះ

ការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើពួកសត្វរស់នៅតាមដងទន្លេ គឺការប្រមាញ់ ការប្រមូលយកពងកូន និង ការរំខានដោយសកម្មភាពមនុស្សនៅលើតំបន់វាលខ្សាច់ក្នុងអំឡុងពេលរដូវពងកូន ។ ការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតគឺការកាប់ព្រៃឈើ និង ការរានដីព្រៃសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនាតាមបណ្តោយមាត់ទន្លេ ។ ការនេសាទខុសច្បាប់ ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល និង គ្រឿងផ្ទុះគឺជាមូលហេតុមួយដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ។ ការគំរាមកំហែងដែលនឹងធ្វើឱ្យមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតគឺជាការសាងសង់នៃតំបន់វារីអគ្គិសនីធំៗ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវនាវាចរណ៍តាមបណ្តោយដងទន្លេមេគង្គ និង ដៃទន្លេធំៗរបស់វា ។

អនុសាសន៍

ការអភិរក្សដងទន្លេមេគង្គដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតំបន់រ៉ាមសារ គឺជាអាទិភាពសំខាន់មួយ ។ ប្រវែងទាំងមូលនៃទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់ IBA គួរតែរៀបចំការអភិរក្ស ហើយផ្តោតតែលើផ្នែកតូចៗនៅដាច់ៗពីគ្នា ដែលអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់រហូតនាំឱ្យមានភាពមហន្តរាយ ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងបន្ថែមទៀត ដោយផ្តោតលើការកំណត់នៃផ្នែកសំខាន់ៗរបស់ព្រៃឈើប្រព័ន្ធទន្លេ និង ព្រែក អូរនានា ព្រមទាំងកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវទីតាំង និង ចំនួនប្រភេទសត្វដែលពងកូនលើវាលខ្សាច់ ។

ការប្រឹងប្រែងត្រូវតែធ្វើឡើង ដើម្បីការពារប្រភេទសត្វស្លាបដែលពងកូនលើវាលខ្សាច់ ខណៈដែលពួកវាកំពុងពងកូន ។ កិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍អាចបង្កើតឡើងតាមភូមិនិមួយៗ ដើម្បីកុំឱ្យតំបន់ទាំងនោះមានការរំខាន ។

ការបង្កើតភូមិថ្មី និង ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មតាមដងទន្លេមិនគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើយ ហើយផ្នែកសំខាន់ៗដែលមានព្រៃឈើប្រព័ន្ធទន្លេ គួរតែការពារឱ្យបានតឹងរឹងពីការកាប់រំលំ និង ការធ្វើកសិកម្មនេចរ ។

សកម្មភាពគ្រប់គ្រង និង អភិរក្សនៃប្រភេទសត្វព្រៃ ព្រមទាំងត្រីសំខាន់ៗ គួរតែបង្កើតឱ្យមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ IBA នេះ ។

ឯកសារយោង

Davidson, P., Poole, C. M. and Duckworth J. W. (2001) Mekong Wagtail (*Motacilla samvaesnae*): the great river's only known avian endemic. *Bull. Oriental Bird Club* 34: 56-59.

Davies, J. D. (1994) *Wetland surveys in Cambodia to identify sites of international importance*. Kuala Lumpur: Asian Wetland Bureau.

Duckworth, J. W., Alström, P., Davidson, P., Evans, T. D., Poole, C. M., Tan SETHA and Timmins, R. J. (2001) A new species of wagtail from the lower Mekong basin. *Bull. Brit. Ornith. Club* 121(3): 152-182.

Mundkur, T., Carr, P., Sun Hean and Chhim Somean (1995) *Surveys for large waterbirds in Cambodia, March-April 1994*. Cambridge, UK: IUCN/SSC.

Poole, C. M. Duckworth, J. W. and van Zalinge, N. J. (in prep.) Bird observations from the Mekong and major tributaries in north-east Cambodia, 1998-2000.

Tan SETHA (2002) Mekong Wagtail: a species new to science discovered in northeast Cambodia. *Cambodia Bird News* : 9: 14-17.

Timmins, R. J. and Men Soriyun (1998) *A wildlife survey of the Tonle San and Tonle Srepok river basins in north-eastern Cambodia*. Hanoi and Phnom Penh: Fauna & Flora International and the Wildlife Protection Office.

Thomas, W.W. 1964. *A preliminary list of the birds of Cambodia*. Unpubl.

van Zalinge, N. J., Poole, C. M., Duckworth, J. W. and Goes, F. (2002) Waterbird counts on the Mekong, Sekong, Sesan and Srepok rivers. *Cambodia Bird News* 9: 18-29.