

តំបន់ផ្ទៃទឹកភ្លៀងទន្លេស្រែពកខាងលើ

A1, A3 & A4i

- ខេត្ត** : រតនគិរី និង មណ្ឌលគិរី
- ស្រុក** : សំរោង យ៉ាដាវ កោះព្រែក និង ពេជ្ររោង
- ផ្ទៃដី (ហិកតា)** : ៥០៧.៧១១
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ៥២ ដល់ ៦៥១
- កូអរដោនេចំនុចកណ្តាល** : ១២^០ ៥៨' ជ ១០៧^០ ១៦' ក



ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ IBA នេះ រួមមានតំបន់ផ្ទៃទឹកភ្លៀងទន្លេស្រែពកផ្នែកខាងលើនៃ ទីរួមស្រុកសំរោង ដោយមិនបញ្ចូលតំបន់នៅ ខាងក្រៅមួយចំនួនដែលមានទីជម្រកបាត់បង់យ៉ាងច្រើននោះទេ ។ តាមលក្ខណៈសណ្ឋានដី តំបន់នេះមានលក្ខណៈរាបស្មើ ទោះបីជា មានកូនភ្នំទាបមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ភ្នំយ៉ាងកែកដោយ ។ រុក្ខជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះគ្របដណ្តប់លើសលប់ដោយព្រៃ រោះលាយឡំជាមួយតំបន់តូចៗនៃព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ។ លើសពីនេះទៀត តំបន់នេះមានតំបន់ដីសើមយ៉ាងច្រើន ដូចជា ទន្លេស្រែពក ដៃរបស់វា និង បឹងដែលកើតឡើងដោយការកាត់ផ្តាច់ពីទន្លេ (Oxbow lakes) ព្រមទាំងអូរជាច្រើនទៀត ខ្លះមានទឹកតាមរដូវកាល និង ខ្លះមានទឹកជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងអំឡុងពេលរដូវប្រាំង ។ មានត្រពាំងជាច្រើន និង វាលស្មៅលិចទឹក តាមរដូវកាល ដែលមានទទឹងប្រហែលពីបីម៉ែត្ររហូតដល់រាប់រយម៉ែត្រ ។ នៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃតំបន់ IBA ត្រូវរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ទីជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ រីឯនៅប៉ែកខាងត្បូងត្រូវរួមបញ្ចូលតំបន់ព្រៃអភិរក្សធនធានសេនេទិច និង សត្វព្រៃ ។

តំបន់ IBA នេះបានទ្រទ្រង់ពពួកសត្វស្លាបសំខាន់ៗរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃរោះ ក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនភាគកណ្តាល ។ ពពួកថនិក សត្វធំៗមានក្រចកជំពាមក៏សម្បូរផងដែរនៅក្នុងតំបន់នេះមានន័យថា តំបន់នេះមានសក្តានុពលយ៉ាងធំធេងក្នុងការទ្រទ្រង់ប្រភេទ ត្នាតផេះ ត្នាតត្នោត និង ត្នាតភ្លើង ដែលចំនួនរបស់វាមានច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ លើសពីនេះទៀត ទន្លេស្រែពកគឺជាទន្លេមួយក្នុងចំណោមតំបន់ពិរ ឬ ប៊ិកនៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលទ្រទ្រង់ប្រភេទពពួកថនិក ទាព្រៃស្លាបស (មានកំណត់ត្រាតែម្តងគត់ពីតំបន់ IBA នេះ) ប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈទីជម្រកនៅក្នុងតំបន់នេះអាចមានលក្ខណៈសមស្របក្នុងការទ្រ ទ្រង់ប្រភេទទាព្រៃស្លាបសនេះ ។ មានកំណត់ត្រាតែម្តងគត់អំពីត្រយឹងចំកំសនៅក្នុងតំបន់នេះ ប៉ុន្តែស្ថានភាពពិតប្រាកដ របស់ប្រភេទនេះនៅតែមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយ ។ ជាចុងក្រោយ មានកំណត់ត្រាតែម្តងគត់នៃប្រភេទពពួកក្បាលព្រៃលើតពី តាមបណ្តោយអូរដាក់ដាម (Dak Dam) ដែលជាអូរនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជា និង វៀតណាម ។ ទោះជាយ៉ាងក្តី ប្រភេទនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងពិតប្រាកដនៅឡើយទេ ថាតើវាត្រូវបានគេកត់ត្រានៅត្រង់ផ្នែកណានៃអូរនេះ ហើយប្រហែល វាអាចមានផងដែរនៅក្នុងតំបន់ស្នួល / កែវសីមា / អូររាំង (KH027) ។ រីឯស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់ត្រយឹងចំកំស មិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ ។

ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ IBA
ក្លោក	Green Peafowl	<i>Pavo muticus</i>	A1
កេងកងធំ	Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	A1

ក្រៀម	Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	A1
ត្នាតត្នាត	Long-billed Vulture	<i>Gyps indicus</i>	A1
ត្នាតផេះ	White-rumped Vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	A1
ត្នាតភ្លើង	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	A1
ត្រដក់តូច	Lesser Adjutant	<i>Leptoptilos javanicus</i>	A1
ត្រយឹងចំកំ ស	White-shouldered Ibis	<i>Pseudibis davisoni</i>	A1
ត្រយឹងយក្ស	Giant Ibis	<i>Pseudibis gigantea</i>	A1 A4i
ទាព្រៃស្លាប ស	White-winged Duck	<i>Cairina scutulata</i>	A1
ពពូលទឹក	Masked Finfoot	<i>Heliopais personata</i>	A1
ស្មៅព្យ	Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	A1
អកត្រីក្បាលប្រផេះ	Grey-headed Fish Eagle	<i>Ichthyophaga ichhyaetus</i>	A1
អកត្រីតូច	Lesser Fish Eagle	<i>Ichthyophaga humilis</i>	A1

ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់

មានសត្វស្លាបមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃតំបន់ភ្នំខ្ពស់ៗ ពីរប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃស្រោង និង ប្រាំបួនប្រភេទរស់ក្នុងប្រភេទព្រៃរេច (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

ប្រភេទពាសជាតិទទួលរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក

ស្វាត្រាស ស្វាក្តាម ស្វាព្រាម និង ស្វាក្រវាត់ ។

ប៊ី និង ពពួកក្រចកចំលាចទទួលរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក

ដីរ រមាំង ខ្លីង ទន្សោង និង ក្របីព្រៃ ។

ប្រភេទអណ្តើក កន្ទាយ និង ក្រពើទទួលរងការគំរាមកំហែងពិភពលោក

ក្រពើទន្លេ (ក្រពើត្រី) អណ្តើកបិទមុខស្លឹកខ្មៅ អណ្តើកសោមញី អណ្តើកក្របីក្បាលលឿង អណ្តើកព្រិច កន្ទាយអាស៊ី និង កន្ទាយក្បាលកង្កែប ។

ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះ

ការគំរាមកំហែងចំបងដែលនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់នេះគឺការបរបាញ់ដែលធ្វើឱ្យមានការគំរាមកំហែងទៅលើពពួកកេងកង សេក ពពូល និង ក្លោក ។ ការបរបាញ់ក៏ជាការគំរាមកំហែងមួយដោយប្រយោលផងដែរទៅលើពពួកត្នាត ដោយពពួកសត្វក្រចកជំពាមទាំងនោះជាប្រភពចំណីដ៏សំខាន់របស់ពួកវា ។ នៅតាមបណ្តោយដងទន្លេស្រែពក ការកាប់ព្រៃឈើ និង ការរានដីព្រៃសម្រាប់ធ្វើដំណាំកសិកម្ម បានកើតឡើងនៅតាមមាត់ទន្លេ ហើយសកម្មភាពនេសាទត្រីបំផ្លិចបំផ្លាញបានកើតឡើងផងដែរ ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល និង គ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗ គឺជាការព្រួយបារម្ភផងដែរ ។ ការគំរាមកំហែងទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងតំបន់នេះអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទពពូលទឹក និង សត្វស្លាបទាំងឡាយដែលរកស៊ីនៅតាមប្រព័ន្ធទន្លេ ។

អនុសាសន៍

វិធានការទាំងឡាយដើម្បីបង្ក្រាបការបរបាញ់ និង ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃត្រូវតែអនុវត្តគ្រប់តំបន់ ។ ការងារនេះគួរតែចាប់ផ្តើមដោយបង្កើតឡើងប្រព័ន្ធល្បាតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សរុក្ខមណ្ឌលគីរី ។

តំបន់ស្នូលនៅផ្នែកខាងលើទន្លេស្រែពក ប្រហែលស្ថិតនៅខាងលិចអូរច្បារ ហើយទន្លេនៅប៉ែកខាងជើង និង ខាងត្បូងរហូតដល់ព្រំដែនរៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវតែមានការពារឱ្យបានតឹងរឹងក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធមានស្រាប់នៃតំបន់ព្រៃការពារ ។

ការអភិរក្សផ្នែកសំខាន់ៗនៃកំណត់ទន្លេស្រែពកគួរតែមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងមូលនៃតំបន់អភិរក្សមានស្រាប់ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការងារនេះត្រូវតែពិនិត្យមើលទ្រង់ទ្រាយប្រវែងរបស់ប្រព័ន្ធទន្លេទាំងអស់ ដែលជាប់ជាមួយនឹងដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ (KH024) ដោយផ្តោតលើផ្នែកសំខាន់ៗរបស់ទន្លេដែលអាចទទួលរងភាពមហន្តរាយ ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមដងទន្លេស្រែពក និង ដែរបស់វាចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្តោតលើការកំណត់ផ្នែកសំខាន់ៗរបស់ព្រៃដុះតាមប្រព័ន្ធទន្លេ និង កំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវចំនួនកន្លែងពងកូនរបស់ពពួកសត្វដែលពងកូនលើវាលខ្សាច់ ។

ការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារប្រភេទសត្វដែលពងកូនលើវាលខ្សាច់ ខណៈដែលពួកវាកំពុងពងកូន ។ កិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍គួរតែបង្កើតឡើងតាមភូមិមួយៗ ដើម្បីឱ្យតំបន់ពងកូនទាំងនោះមិនមានការរំខាន ។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ ការតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ និង ការទន្ទ្រានយកដីនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៃតំបន់ IBA គួរតែហាមឃាត់ ។

ការបោះទីតាំងភូមិថ្មី និង ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មតាមបណ្តោយដងទន្លេស្រែពកមិនគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើយ ហើយផ្នែកសំខាន់ៗនៃព្រៃដុះតាមប្រព័ន្ធទន្លេដែលគេបានកំណត់រួចហើយនោះគួរតែការពារឱ្យតឹងរឹងពីការកាប់រំលំ និង ការធ្វើកសិកម្មពនេធរ ។

ឯកសារយោង

Barzen, J. (2001) Waterbirds and wetlands of northern Cambodia. *Bugle* 27(4): 1-2.

Barzen, J. (2002) Waterbirds and wetlands of northern Cambodia. *Cambodia Bird News* 9:36-38.

Brickle, N. W., Nguyen Cu, Ha Quy Quynh, Nguyen Thai Tu Cuong and Hoang Van San (1998) *The status and distribution of Green Peafowl Pavo muticus in Dak Lak province, Vietnam*. Hanoi: BirdLife International Vi etnam Programme.

Davidson, P., Poole, C. M. and Duckworth J. W. (2001) Mekong Wagtail (*Motacilla samveasnae*): the great river's only known avian endemic. *Bull. Oriental Bird Club* 34: 56-59.

Duckworth, J. W., Alström, P., Davidson, P., Evans, T. D., Poole, C. M., Tan Setha and Timmins, R. J. (2001) A new species of wagtail from the lower Mekong basin. *Bull. Brit. Ornith. Club* 121(3): 152-182.

Goes, F. (1999) Notes on selected bird species in Cambodia. *Forktail* 15: 25-27.

Long, B., Swan, S. R. and Kry Masphal (2000) Biological surveys in northeast Mondulakiri, Cambodia. Hanoi and Phnom Penh: Fauna & Flora International and the Wildlife Protection Office.

Poole, C. M. Duckworth, J. W. and van Zalinge, N. J. (in prep.) Bird observations from the Mekong and major tributaries in north-east Cambodia, 1998-2000.

Tan Setha (2002) Mekong Wagtail *Motacilla samveasnae*: emblem of the riverine birds of northeast Cambodia. *Cambodia Bird News* 9:14-17.

Timmins, R. J. and Men Soriyun (1998) *A wildlife survey of the Tonle San and Tonle Srepok river basins in north-east ern Cambodia*. Hanoi and Phnom Penh: Fauna & Flora International and the Wildlife Protection Office.

Timmins, R. J. and Ou Rattanak (2001) *The importance of Phnom Prich Wildlife Sanctuary and adjacent areas for the conservation of Tigers and other key species*. Phnom Penh: WWF.

van Zalinge, N. J., Poole, C. M., Duckworth, J. W. and Goes, F. (2002) Waterbird counts on the Mekong, Sekong, Sesan and Srepok rivers. *Cambodia Bird News* 9: 18-29.