

ភ្នំបូកគោ

A1, A2 & A3

- គោ** : កំពត ក្រុងព្រះសីហនុ និង កោះកុង
- ស្រុក** : កំពត ព្រៃនប់ និង កំពង់សិលា
- ផ្ទៃដី (ហិកតា)** : ១០១.៥៨៧
- រយៈកំពស់ (ម៉ែត្រ)** : ៩ ដល់ ១.៣២៥
- កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល** : ១០⁰ ៥១' ជ ១០៤⁰ ០២' ក



ការពិពណ៌នាទីកន្លែង

តំបន់ IBA នេះ ស្ថិតក្នុងឧទ្យានជាតិបូកគោ និង ជួរភ្នំដំរី ដែលលាតសន្ធឹងទៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៤ និង តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ តាមលក្ខណៈសណ្ឋានដី តំបន់ឧទ្យានជាតិនេះត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយខ្ពង់រាបជាច្រើន ដែលមានរយៈកំពស់ប្រហែល១.០០០ម៉ែត្រធៀបទៅនឹងនិរ្វិសមុទ្រ ។ តំបន់សត្វស្លាបសំខាន់ៗនេះរួមមានផ្នែកជាច្រើននៃឧទ្យានជាតិដែលគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និង ព្រៃស្រោង ចាប់ពីរយៈកំពស់៤០០ម៉ែត្រធៀបនឹងនិរ្វិសមុទ្រ ដែលគេគិតថា ជារយៈកំពស់មួយទាបជាងរយៈកំពស់របស់ក្រូចសំពៅ និង តំបន់ស្ទឹងទឹកឈូ ដែលមានវត្តមានប្រភេទអកត្រីតូច ។ រុក្ខជាតិដុះលើខ្ពង់រាបគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃស្រោងទាបៗលាយឡំជាមួយតំបន់ព្រៃដែលត្រូវបានគេកាប់ឆ្ការ ហើយដុះជំនួសវិញដោយស្មៅ និង មានតំបន់ដីសើមសិប្បនិម្មិតជាច្រើនកន្លែង ។ ខ្ពង់រាបនេះមានចំណោតចោត រីឯភ្នំតូចៗ និង កំពូលរបស់វាគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ។ ស្ទឹងទឹកឈូហូរចាក់ទៅទិសនិរតី ហើយបន្ទាប់មកហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៃខេត្តកំពត និង នៅមានព្រែក និង អូរតូចៗជាច្រើនផ្សេងទៀតហូរកាត់ខ្លាត់ខ្លាងនៅក្នុងតំបន់នេះទាំងមូល ។

តំបន់ IBA បានទ្រទ្រង់ប្រភេទក្រូចសំពៅដែលជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោមពីរប្រភេទដែលត្រូវបានរកឃើញនៅតាមតំបន់ជួរភ្នំប្រទេសកម្ពុជា-ថៃ ។ លើសពីនេះទៀត មានការកត់ត្រាមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាយូរមកហើយនៃប្រភេទចេកទុំប្រាក់ (Silver Oriole *Oriolus mellianus*) នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩២៧ ដែលបានបន្សល់ទុកជាកំណត់ត្រាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៃប្រភេទរងគ្រោះនេះ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រភេទនេះនៅតែមាននៅក្នុងតំបន់ IBA ជាប្រភេទបន្ទាត់ទីតែមិនបានបង្ហាត់ពូជនៅទីនោះឡើយ ។

ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ

ឈ្មោះខ្មែរ	ឈ្មោះអង់គ្លេស	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យIBA
កេងកងធំ	Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	A1
ក្រោក	Green Peafowl	<i>Pavo muticus</i>	A1
ក្រូចសំពៅ ឬ មាន់ក្រិច	Chestnut-headed Partridge	<i>Arborophila cambodiana</i>	A1 A2
អកត្រីតូច	Lesser Fish-eagle	<i>Ichthyophaga humilis</i>	A1

ប្រភេទសត្វប្រមូលផ្តុំក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់

មានសត្វស្លាបប្រាំមួយប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃតំបន់ភ្នំខ្ពស់ៗ ១២ប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រភេទព្រៃស្រោង និង មួយប្រភេទរស់ក្នុងប្រភេទព្រៃបោះ (សូមមើលតារាងឧបសម្ព័ន្ធ៤) ។

ប្រភេទពានជាតិទទួលរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក

ទោចម្ពុដ ស្វាត្រាស រញ្ជីប្រផេះ ។

ដំរី និង ពពួកក្រចកចំពោះទទួលរងការគំរាមកំហែងពិបាកលោក

ដំរី ខ្លឹង និង កែវ ។

ការគំរាមកំហែងលើជីវៈចម្រុះ

ព្រៃឈើជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ IBA ត្រូវបានកាប់ផ្តុំរំលំ ហើយក៏មានការកាប់ឫស្សី និង អនុផលព្រៃឈើផ្សេងៗទៀតផងដែរ ។ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានគេដាក់ប្រមាណថា មានឥទ្ធិពលលើឧទ្យានជាតិបូកគោប្រមាណ៨០% ។ ការថយចុះ និង ការបាត់បង់ទីជីវៈក៏ជាការគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ IBA នេះគួបផ្សំនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានកាប់ឆ្កាត្រៃសម្រាប់ដឹកសិកម្ម ។ ការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយផ្សេងទៀតនោះគឺការប្រមាញ់ដោយមានការប្រើប្រាស់អន្ទាក់យ៉ាងច្រើន ។ ប្រភេទសត្វស្លាប ដូចជាក្រចកសំពៅ ក្រោក ពពួកកេងកងត្រូវបានឃើញគេតាំងលក់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៤ ។ ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយ ក៏សកម្មភាពនៃការអនុវត្តន៍ច្បាប់ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយ ឬ លុបបំបាត់ការបរាញ់ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយទទួលបានជោគជ័យគួរឱ្យកត់សំគាល់នាពេលថ្មីៗនេះ ។

អនុសាសន៍

សកម្មភាពនៃការអនុវត្តន៍ច្បាប់ និង ការល្បាតរបស់សត្វរក្សដែលកំពុងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឧទ្យានជាតិបូកគោបានផ្តោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពលើសច្បាប់ទាំងឡាយដូចជា ការបរាញ់ និង ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគួរតែត្រូវបន្ត និង ពង្រីកសកម្មភាពនេះឱ្យបានគ្របដណ្តប់លើតំបន់សំខាន់ៗ ។

ឯកសារយោង

Akers, P. (2000) *Bird surveys in Cambodia January-March 2000*. Unpublished sabbatical report to RSPB.
BirdLife International (2001) *Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book*. Cambridge, U.K.: BirdLife International.
Delacour, J. (1929) On the birds collected during the fourth French expedition to French Indochina. *Ibis* 12 (5): 193-220.
Delacour, J. and Jabouille, P. (1928) Twenty-one new birds from Indo-China. *Bull. Brit. Orn. Club* 48: 125-136
Delacour, J., and Jabouille, P. (1931) *Les Oiseaux de l'Indochine Francaise*. vols I-IV. Paris: Exposition Coloniale Internationale. (In French.)
Engelbach, P. (1936) Notes de la région de Kampot (Cambodge). *L'Oiseau et la Revue Francaise d'Ornithologie*. 6: 347-348. (In French.)
Engelbach, P. (1938) Note sur quelques oiseaux du Cambodge. *L'Oiseau et la Revue Francaise d'Ornithologie*. 8: 384-394. (In French.)
Engelbach, P. (1948) Liste complémentaire aux oiseaux du Cambodge. *L'Oiseau et la Revue Francaise d'Orni thologie*. 18: 5-26. (In French.)
Goes, F. Tan Setha and Ros Bansok (1998) *Preliminary bird survey for cluster of three national parks in southern C ambodia*. Phnom Penh: European Commission Support Programme to the Environment Sector in C ambodia.
Goes, F. and Davidson, P. eds. (2002) Recent sightings. *Cambodia Bird News* 9: 47-59.
Net Neath and Tan Setha eds. (2001) A wildlife survey of Bokor National Park, Cambodia. Phnom Penh: Wildlife C onservation Society.
Poole, C. M. (1999) Little known oriental bird: Chestnut-headed Partridge *Arborophila cambodiana*. *Bull. Oriental Bird Club* 30: 46-50.

Tan Setha and Pech Bunnat (2000) *Threatened galliformes of Cambodia*. Paper presented at the International Galliformes Symposium, Kathmandu, Nepal, September 2000.

Tan Setha and Pech Bunnat (2001) Recent information on the status and conservation of galliformes in Cambodia. Pp. 39-44 in P. McGowan ed. *Galliformes 2000: Proceedings of the 2nd International Galliformes Symposium*. Reading: World Pheasant Association.

Thomas, W.W. 1964. *A preliminary list of the birds of Cambodia*. Unpubl.